



#ZeroMeningitis
que nada te pare

Si tienes 12, 15 o 18 años, o eres familiar o amigo de alguien con esta edad, esta información te interesa muchísimo.

i

¿QUÉ ES LA MENINGITIS?

Una **inflamación** de las cubiertas del cerebro que lo irrita y lo oprime, pudiendo dejar secuelas neurológicas o provocar incluso la muerte.

¿QUÉ ES LA SEPSIS?

Es una **infección** generalizada muy grave, con aparición progresiva de manchas en todo el cuerpo. Puede dejar secuelas o provocar la muerte.

Ambas pueden ser causadas por los meningococos, unas **bacterias** que pueden ser de varios tipos: A, B, C, X, W, Y.



¿NOS AFECTA MÁS A LOS ADOLESCENTES?

Sí, hay más casos de meningitis C, W e Y en adolescentes y jóvenes. Además, son quienes más fácilmente pueden transmitir estas bacterias a otros adolescentes o a personas de cualquier edad.



¿DÓNDE Y CÓMO ME PUEDO VACUNAR PARA EVITAR TODO ESTO?




Si tienes 12, 15 o 18 años acude con **cita previa** a tu centro de salud (acompañado de tu padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad). La vacuna de la Meningitis ACWY es **segura y efectiva**. ¡Y es solo una dosis!



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

#AndaluciaSeVacuna

Más información en www.andavac.es/campanas/meningitis





#ZeroMeningitis
que nada te pare

Si tienes 12, 15 o 18 años, o eres familiar o amigo de alguien con esta edad, esta información te interesa muchísimo.




¿MÁS CUESTIONES SOBRE LA VACUNA CONTRA LA MENINGITIS ACWY?

¿POR QUÉ SÓLO SE VACUNAN LOS QUE TIENEN 12, 15 O 18 AÑOS?



Se trata de una forma de organizar la vacunación progresiva de la meningitis ACWY de todos los chicos y chicas de 12 a 18 años de Andalucía. Durante **los años 2020, 2021 y 2022**, se irán vacunando todos conforme vayan cumpliendo 12, 15 o 18 años.



¿SI ESA VACUNA ME LA HAN PUESTO ANTES, ME LA TENGO QUE PONER DE NUEVO?

Si te la pusieron con 10 años o más, no te la tienes que poner de nuevo, ya estarías protegido. Pero si te la pusieron con menos de 10 años, te la debes poner de nuevo para estar seguros de que estás bien protegido.

¿SE PUEDE PONER A LA VEZ QUE OTRAS VACUNAS?

Sin ningún problema, **se puede poner a la vez que otras vacunas**, como la del papilomavirus, la varicela, la del tétanos-difteria. Se pondría en el otro brazo.

¿PUEDE LA VACUNA PROVOCAR MENINGITIS?



Esta vacuna **no puede producir meningitis**, porque contiene un trozo muy pequeño de la bacteria, incapaz de producir la enfermedad.



¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?

Las vacunas son muy seguras. Esta vacuna no suele producir efectos secundarios, si acaso, algo de molestia o dolor en el sitio de la inyección, de menos de 1-2 días de duración.

Otros efectos secundarios como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, son más raros aún, y normalmente duran muy poco tiempo.



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

#AndaluciaSeVacuna

Más información en www.andavac.es/campanas/meningitis



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

VACUNACIÓN FRENTE AL MENINGOCOCO ACWY (NIMENRIX) EN CENTROS EDUCATIVOS

Enfermedad meningocócica

La enfermedad meningocócica es una enfermedad grave, de declaración obligatoria urgente considerada una alerta de salud pública.

Está causada por el agente infeccioso: *Neisseria meningitidis*, del que se han identificado 13 serogrupos.

El reservorio es el ser humano, se transmite de forma directa de persona a persona por secreciones de la vía respiratoria y tras un contacto estrecho y prolongado

El periodo de incubación varía entre 2 y 10 días, pero habitualmente es de 3-4 días, con una tasa de letalidad elevada y graves secuelas

Síntomas

Se presenta de forma aguda con manifestaciones clínicas que pueden ser muy variadas, las más comunes son la meningitis y la sepsis. Otras presentaciones menos frecuentes son la neumonía, artritis séptica, pericarditis, uretritis y conjuntivitis.

Suele tener un comienzo brusco, con fiebre, cefalea intensa, náuseas, vómitos, rigidez de nuca. La infección meningocócica puede limitarse a la nasofaringe, produciendo síntomas locales, o puede progresar a enfermedad invasora y producir un cuadro de púrpura fulminante con postración súbita y shock.

¿Cuál es el estado actual de de la enfermedad meningocócica?

En Andalucía, la enfermedad meningocócica invasiva presenta una incidencia de **0,87 casos por 100.000 habitantes**, (73 casos en el periodo 2018-2019), con una **mortalidad del 17.8%**. Presenta una tasa de **secuelas permanentes en torno al 30%**. Los datos en el resto de España son similares.

Puede afectar a cualquier edad, siendo en la infancia y en la adolescencia donde se observa una mayor incidencia.





¿Por qué se inicia una campaña de vacunación frente al meningococo ACWY en adolescentes?

En los últimos 5 años se ha producido un **aumento progresivo de casos** por meningococos del tipo W e Y, en algunos casos de especial virulencia y rápida expansión que elevó la letalidad en temporadas pasadas hasta el 30% en el conjunto del país.

En la franja de edad entre 15 y 19 años se registra habitualmente un aumento de incidencia y una mayor tasa de portadores faríngeos de meningococos durante la adolescencia, sirviendo de vehículo de diseminación al resto de la población.

El 1 de enero de 2020 se inició una campaña de vacunación de 3 años de duración, con la población con edad entre 13 y 18 años (inclusive) con la vacuna del meningococo ACWY (Nimenrix). Así, cada año, durante 3 años consecutivos, se vacunará a las personas conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años de edad.

La fecha prevista de fin de la campaña será el 31 de diciembre 2022.

La inmunización se realiza mediante una inyección intramuscular. El lugar de inyección recomendado es la cara anterolateral del muslo o el músculo deltoides.

Para ampliar esta información, recomendamos la lectura de los documentos disponibles en <https://www.andavac.es/campanas/meningitis/>