

#ZeroMeningitis

que nada te pare



SI TIENES ENTRE 12 Y 20 AÑOS



VACÚNATE CONTRA LA MENINGITIS



ACWY

Más información sobre la meningitis, cómo y dónde vacunarte



A
Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias
#AndaluciaSeVacuna

#ZeroMeningitis

que nada te pare

Si tienes entre 12 y 20 años, o eres familiar o amigo de alguien con esta edad, esta información te interesa muchísimo.

i


¿QUÉ ES LA MENINGITIS?

Una **inflamación** de las cubiertas del cerebro que lo irrita y lo oprime, pudiendo dejar secuelas neurológicas o provocar incluso la muerte.

¿QUÉ ES LA SEPSIS?

Es una **infección** generalizada muy grave, con aparición progresiva de manchas en todo el cuerpo. Puede dejar secuelas o provocar la muerte.

Ambas pueden ser causadas por los meningococos, unas **bacterias** que pueden ser de varios tipos: A, B, C, X, W, Y.



¿NOS AFECTA MÁS A LOS ADOLESCENTES?

Sí, hay más casos de meningitis C, W e Y en adolescentes y jóvenes. Además, son quienes más fácilmente pueden transmitir estas bacterias a otros adolescentes o a personas de cualquier edad.

¿DÓNDE Y CÓMO ME PUEDO VACUNAR PARA EVITAR TODO ESTO?



Si tienes **entre 12 y 20 años** acude con **cita previa** a tu centro de salud (acompañado de tu padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad). La vacuna de la Meningitis ACWY es **segura y efectiva**. ¡Y es sólo una dosis!



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

#AndaluciaSeVacuna

Más información en www.andavac.es/campanas/meningitis



#ZeroMeningitis

que nada te pare

Si tienes entre 12 y 20 años, o eres familiar o amigo de alguien con esta edad, esta información te interesa muchísimo.



¿MÁS CUESTIONES SOBRE LA VACUNA CONTRA LA MENINGITIS ACWY?

¿POR QUÉ SE VACUNARÁN LOS QUE TIENEN ENTRE 12 Y 20 AÑOS?



La adolescencia es un momento de mayor riesgo. Desde el año 2020 se están vacunando todos de forma progresiva.

¿SI ESA VACUNA ME LA HAN PUESTO ANTES, ME LA TENGO QUE PONER DE NUEVO?

Si te la pusieron con 10 años o más, no te la tienes que poner de nuevo, ya estarías protegido. Pero si te la pusieron con menos de 10 años, te la debes poner de nuevo para estar seguros de que estás bien protegido.

¿SE PUEDE PONER A LA VEZ QUE OTRAS VACUNAS?

Sin ningún problema, **se puede poner a la vez que otras vacunas**, como la del papilomavirus, la varicela, la del tétanos-difteria. Se pondría en el otro brazo.

¿PUEDE LA VACUNA PROVOCAR MENINGITIS?

Esta vacuna **no puede producir meningitis**, porque contiene un trozo muy pequeño de la bacteria, incapaz de producir la enfermedad.

¿TIENE EFECTOS SECUNDARIOS?

Las vacunas son muy seguras. Esta vacuna no suele producir efectos secundarios, si acaso, algo de molestia o dolor en el sitio de la inyección, de menos de 1-2 días de duración.

Otros efectos secundarios como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, son más raros aún, y normalmente duran muy poco tiempo.



Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Familias

#AndaluciaSeVacuna

Más información en www.andavac.es/campanas/meningitis